NEPTRA®

*SOYEZ LEUR HÉROS au quotidien contre les otites externes aiguës**

Neptra®, votre acolyte au quotidien pour les otites externes aiguës mixtes du chien.

OBSERVANCE — Le 1er traitement administré en 1 seule dose contre l'otite externe aiguë mixte du chien

Plus de praticité pour le vétérinaire :
- **Contrôle total sur l'observance** du traitement
- **Valorisation des actes** médicaux
- **Limitation de l'automédication**

Plus de simplicité pour le propriétaire :
- **Aucun traitement à administrer** à domicile
- **Aucune contrainte**
- **Satisfaction** du propriétaire

Plus de sérénité pour le chien :
- **Diminution du stress** lié aux manipulations répétées de l'oreille
- Amélioration du **confort** du chien
- **Préservation du lien** entre le propriétaire et son chien

EFFICACITÉ — Une association unique de trois principes actifs

FUROATE DE MOMÉTASONE
- Possède des propriétés anti-inflammatoires puissantes et antiprurigineuses
- Glucocorticoïde puissant (Groupe III de la classification de McKenzie)[1]
- Molécule lipophile, faible absorption percutanée, métabolisation rapide :
  - Risques effets indésirables systémiques limités[2]
- Action ciblée essentiellement au niveau de l'épiderme :
  - Bonne tolérance locale[2]



FLORFÉNICOL
- Activité bactériostatique temps dépendante sur la plupart des bactéries à Gram positif et à Gram négatif dont *S. pseudintermedius*
- Faible niveau de résistance au florfénicol en pratique : 99% sensibilité du *S. pseudintermedius* lors d'otite externe chez le chien[3]
- Antibiotique indiqué dans le traitement initial de l'otite externe aiguë[4]

CHLORHYDRATE DE TERBINAFINE
- Inhibe la synthèse de l'ergostérol, un composant de la membrane des cellules fongiques
- Mode d'action différent de celui des antifongiques azolés
- Efficace contre *M. pachydermatis*, la levure la plus fréquemment associée à l'otite externe aiguë chez le chien[5]

Traitement initial**[4] contre les pathogènes les plus fréquemment retrouvés lors d'otite externe aiguë mixte chez le chien *Staphylococcus pseudintermedius* et *Malassezia pachydermatis*[6]

PRATICITÉ

- **Nettoyage unique** en amont de l'application du traitement
- Pas de nettoyage de l'oreille pendant **28 jours**
- **Liquide transparent** qui se distribue facilement dans le conduit auditif externe
- **1 ml** par oreille atteinte pour traiter les chiens de toutes tailles
- Conservation à **température ambiante**
- Existe en pack de **10 et 20 pipettes**

*Otites externes aiguës mixtes à *Staphylococcus pseudintermedius* et *Malassezia pachydermatis*

**Cible Staphylococcus pseudintermedius et Malassezia pachydermatis reconnus comme sensibles respectivement au florfénicol et à la terbinafine.

NOUVEAU

Disponible en packs de 10 et packs de 20 !

Elanco vous accompagne au quotidien dans le diagnostic et la prise en charge thérapeutique :

Établir un score Otis

Réaliser une cytologie

Guide d'observation au microscope

Choix topiques

Scannez pour voir la vidéo pour apprendre à faire une cytologie auriculaire

NEPTRA®

SOYEZ LEUR HÉROS

au quotidien contre les otites externes aiguës mixtes à Staphylococcus pseudintermedius et Malassezia pachydermatis

Une SEULE dose — **1 dose unique** administrée par vos soins

Anti-inflammatoire puissant[1]
Mométasone furoate

Traitement initial[4]**
Florfénicol (antibactérien)
Terbinafine (antifongique)

Ce médicament contient un antibiotique. Toute prescription d'antibiotiques a un impact sur les résistances bactériennes. Elle doit être justifiée. Utilisez ce médicament selon les recommandations du Résumé des Caractéristiques du Produit (cf. http://www.ircp.anmv.anses.fr/).

NEPTRA SOLUTION AURICULAIRE POUR CHIENS. Espèce cible : Chiens. **Composition :** 1 pipette (1 mL) contient : florfénicol 16,7 mg ; terbinafine 14.9 mg (équivalent à 16,7 mg de chlorhydrate de terbinafine) ; mométasone furoate 2,2 mg. **Indications :** Traitement des otites externes aiguës ou des manifestations aiguës des otites externes récidivantes causées par des infections mixtes, par des bactéries sensibles au florfénicol (*Staphylococcus pseudintermedius*) et des champignons sensibles à la terbinafine (*Malassezia pachydermatis*). **Contre-indications :** Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité aux substances actives, à d'autres corticoïdes ou à l'un des excipients. Ne pas utiliser en cas de perforation du tympan. Ne pas utiliser chez les chiens présentant une démodécie généralisée. Ne pas utiliser chez les femelles gestantes ou chez les animaux destinés à la reproduction. **Effets indésirables :** Des cas de surdité ou de déficience auditive ont été rapportés dans de très rares cas chez les chiens, principalement chez les animaux âgés, depuis la mise sur le marché. Des vocalises, des secouments de la tête et une douleur au site d'application peu après l'administration du médicament ont été rapportés depuis la mise sur le marché. De l'ataxie, des troubles de l'oreille interne, du nystagmus, des vomissements, de l'érythème au site d'application, de l'hyperactivité, de l'anorexie, de l'inflammation du site d'application et des troubles oculaires (tels que l'irritation de l'œil, le blépharospasme, la conjonctivite, l'ulcère cornéen, la kératoconjonctivite sèche) ont été rapportés depuis la mise sur le marché. **Lire attentivement la notice avant utilisation. Conditions de délivrance :** Usage vétérinaire. A ne délivrer que sur ordonnance, Liste I. VAD 04/2022 - AP 2023/3956 - PM-FR-23-0270 - 11/2023 ELANCO France SAS, 3 Av de la Cristallerie, 92310 Sèvres France au capital de 1.708.200 € - RCS 417350386 Nanterre

1. BREMENT, Les otites externes canines : critères de choix d'un traitement auriculaire, *Le Point Vétérinaire*, 2017, N° 38, 14-19.
2. SPADA, Fabrizio, BARNES, Tanya M., et GREIVE, Kerryn A. Comparative safety and efficacy of topical mometasone furoate with other topical corticosteroids. *Australasian Journal of Dermatology*, 2018, vol. 59, no 3, p. e168-e174.
3. Anses, Résapath, rapport annuel 2021.
4. PATERSON, Sue. The use of antibiotics and antimycotics in otitis. Companion Animal, 2018, vol. 23, no 11, p. 608-613.
5. GUILLOT, Jacques et BOND, Ross. Malassezia yeasts in veterinary dermatology: an updated overview. Frontiers in cellular and infection microbiology, 2020, vol. 10, p. 79.
6. LYSKOVA, P., VYDRZALOVA, M., et MAZUROVA, J. Identification and antimicrobial susceptibility of bacteria and yeasts isolated from healthy dogs and dogs with otitis externa. *Journal of Veterinary Medicine Series A*, 2007, vol. 54, no 10, p. 559-563.